CORRECTION DU DEVOIR SURVEILLE 1

Exo I. On fixe $x_0 \in]1, +\infty[$ et on pose

$$x_{n+1} = x_n + 1 + \frac{1}{x_n - 1} \quad (n \geq 0)$$

1. L'application $f : x \mapsto x + 1 + \frac{1}{x-1}$ est dérivable sur $]1, +\infty[$ et sa dérivée est

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} \quad (x > 1).$$

Pour $x > 1$, nous remarquons que

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\iff 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \\ &\iff \frac{1}{(x-1)^2} = 1 \\ &\iff (x-1)^2 = 1 \\ &\iff x-1 = 1 \\ &\iff x = 2 \end{aligned}$$

Par ailleurs, $f'(x)$ tend vers 1 en $+\infty$ et vers $-\infty$ en 1^+ de sorte que (je ne dessine pas les TAB de VAR, c'est trop pénible à dactylographier, mais je le décris) : $f'(x) < 0$ pour $1 < x < 2$ et $f'(x) > 0$ pour $2 < x$. A fortiori, f décroît strictement sur $]1, 2]$, de $+\infty$ à $f(2) = 4$, et croît strictement sur $[2, +\infty[$, de 4 à $+\infty$ de

2. Etude de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$

a. Pour $n \in \mathbb{N}$, prouvons par récurrence la proposition

$$P_n : \quad x_n \text{ EST BIEN DÉFINI ET } x_n > 0$$

- P_0 est vraie car x_0 est fixé par l'énoncé dans $]1, +\infty[$.
- Supposons P_n pour un entier $n \geq 0$ et montrons P_{n+1} .
Comme f est définie sur $]1, +\infty[$, qui contient x_n d'après P_n , le nombre $f(x_n) = x_{n+1}$ est bien défini. Comme f ne prend que des valeurs dans $[4, +\infty[$ d'après le résultat de la question précédente, nous avons de plus que $x_{n+1} = f(x_n) \geq 4 > 1$. Donc P_{n+1} est vraie

En conclusion, la proposition P_n est vraie pour $n \in \mathbb{N}$.

- b. Pour $n \geq 0$, nous remarquons que $x_{n+1} - x_n = f(x_n) - x_n = 1 + \frac{1}{x_n - 1} > 0$ car $x_n > 1$. En particulier, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante
- c. Montrer par l'absurde que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$. Supposons que la suite (x_n) converge, vers une limite finie ℓ . Comme la suite u est croissante et comme $u_n \geq u_0$, par conservation des inégalités larges par passage à la limite, il vient $\ell \geq u_0 > 1$. Par passage à la limite dans la relation $x_{n+1} = f(x_n)$ (et par continuité de la fonction f sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$), nous obtenons alors que

$$\ell = f(\ell) = \ell + 1 + \frac{1}{\ell - 1}$$

En particulier, $0 = 1 + \frac{1}{\ell - 1} > 0$ ce qui est impossible. En conclusion, la suite (x_n) ne peut pas converger vers une limite finie, et comme c'est une suite croissante, elle diverge nécessairement vers $+\infty$.

3. Etude de la suite $\left(\frac{x_n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

a. Pour $n \in \mathbb{N}$, prouvons par récurrence la proposition

$$P_n : \quad x_n \geq n + 1$$

- P_0 est vraie car $x_0 > 1$ de sorte que $x_0 \geq 0 + 1$
- Supposons P_n pour un entier $n \geq 0$ et montrons P_{n+1} Comme $x_n \geq n + 1$ d'après P_n , nous remarquons que

$$x_{n+1} = x_n + 1 + \frac{1}{x_n - 1} \geq n + 1 + \frac{1}{x_n - 1} \geq n + 1$$

En conclusion, la proposition P_n est vraie pour $n \in \mathbb{N}$.

b. Pour $n \geq 2$, nous déduisons de l'inégalité précédente que

$$x_n - x_{n-1} - 1 = x_{n-1} + 1 + \frac{1}{x_{n-1} - 1} - x_{n-1} - 1 = \frac{1}{x_{n-1} - 1}$$

Comme $x_{n-1} \geq n - 1 + 1 = n > 0$, il vient

$$0 \leq x_n - x_{n-1} - 1 = \frac{1}{x_{n-1} - 1} \leq \frac{1}{n - 1}$$

c. En sommant cette inégalité pour $2 \leq k \leq n$, il résulte du principe des sommes télescopiques que

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n (x_k - x_{k-1} - 1) &= \sum_{k=2}^n x_k - \sum_{k=2}^n x_{k-1} - \sum_{k=2}^n 1 \\ &= \sum_{k=2}^n x_k - \sum_{k'=1}^{n-1} x_{k'} - (n - 1) \quad \text{CDI } k' = k - 1 \\ &= \sum_{k=2}^{n-1} x_k + x_n - (x_1 + \sum_{k'=2}^{n-1} x_{k'}) - (n - 1) \quad \text{Chasles} \\ &= x_n - x_1 - (n - 1) \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

Mais nous déduisons également de l'inégalité du 3b que

$$0 = \sum_{k=2}^n 0 \leq \sum_{k=2}^n (x_k - x_{k-1} - 1) \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k - 1} = \sum_{k'=1}^{n-1} \frac{1}{k'} \quad \text{CDI } k'=k-1$$

En particulier, pour $n \geq 2$, nous obtenons que $0 \leq x_n - x_1 - (n - 1) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$

d. i. Pour $0 < x < 1$, la fonction $h : x \mapsto x + \ln(1 - x)$ est dérivable de dérivée

$$h'(x) = 1 - \frac{1}{1 - x} < 0$$

En particulier, h est décroissante et vérifie $f(0) = 0$ De sorte que h est négative sur $]0,1[$. A fortiori, on a $x \leq -\ln(1 - x)$ pour $0 < x < 1$.

ii. Pour $k \geq 2$, l'inégalité précédente pour $x = \frac{1}{k} \in]0,1[$ donne que

$$\frac{1}{k} = x \leq -\ln(1 - x) = -\ln\left(1 - \frac{1}{k}\right) = -\ln\left(\frac{k-1}{k}\right) = \ln(k) - \ln(k-1)$$

iii. Soit $n \geq 2$. En somant l'inégalité précédente de $k = 2$ à $n - 1$, nous déduisons encore du principe des sommes télescopiques que

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k} &\leq \sum_{k=2}^{n-1} (\ln(k) - \ln(k-1)) \\ &\leq \sum_{k=2}^{n-1} \ln(k) - \sum_{k=2}^{n-1} \ln(k-1) \\ &\leq \sum_{k=2}^{n-1} \ln(k) - \sum_{k'=1}^{n-2} \ln(k') \quad \text{CDI } k' = k - 1 \\ &\leq \sum_{k=2}^{n-2} \ln(k) + \ln(n-1) - (\ln(1) + \sum_{k'=2}^{n-2} \ln(k')) \\ &\leq \ln(n-1) \end{aligned}$$

En particulier, en ajoutant 1, nous concluons que

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = 1 + \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k} \leq 1 + \ln(n-1) \quad (n \geq 2)$$

iv. Pour $n \geq 2$, il résulte alors de l'inégalité établie au 3c et au 3diii que

$$0 \leq x_n - x_1 - (n-1) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \leq 1 + \ln(n-1)$$

En particulier, comme $x_1 = f(x_0) \geq 4$, on a

$$n+1 \leq x_1 + n - 1 \leq x_n \leq x_1 + (n-1) + 1 + \ln(n-1) = x_1 + n + \ln(n-1) \quad (n \geq 2)$$

v. En divisant par n , nous obtenons que

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} \leq \frac{x_n}{n} \leq \frac{x_1}{n} + 1 + \frac{\ln(n-1)}{n} \quad (n \geq 2)$$

Comme le théorème de croissance comparée induit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n-1)}{n} = 0$, et comme le membre de gauche et de droite tendent vers 1, il résulte du principe des gendarmes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{n} = 1$

Exo II. Pour $n \geq 1$, on pose

$$S_n = \sum_{k=1}^n (k-1)^2 k! \quad T_n = \sum_{k=1}^n (k^2 + 1)k! \quad \text{et} \quad W_n = \sum_{k=1}^n k \times k!$$

1. a. Pour $k \geq 1$, on remarque que $(k+1)! - k! = (k+1) \times k! - k! = ((k+1)-1) \times k! = k \times k!$
- b. En reportant dans l'expression de W_n , il résulte du principe des sommes télescopiques que

$$\begin{aligned} W_n &= \sum_{k=1}^n k \times k! = \sum_{k=1}^n ((k+1)! - k!) \\ &= \sum_{k=1}^n (k+1)! - \sum_{k=1}^n k! \\ &= \sum_{k'=2}^{n+1} k'! - \sum_{k=1}^n k! \quad \text{CDI } k' = k+1 \\ &= \sum_{k'=2}^n k'! + (n+1)! - (1! + \sum_{k=2}^n k!) \quad \text{Chasles} \\ &= (n+1)! - 1 \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

2. a. Pour $n \geq 1$, nous remarquons que

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n (k-1)^2 k! \\ &= \sum_{k=1}^n (k^2 - 2k + 1)k! \\ &= \sum_{k=1}^n (k^2 + 1)k! - 2 \sum_{k=1}^n k \times k! \\ &= T_n - 2W_n \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

- b. Pour $n \geq 1$, prouvons par récurrence la proposition

$$P_n : \quad S_n = 2 + (n-2) \times (n+1)!$$

- P_1 est vraie car $S_1 = \sum_{k=1}^1 (k-1)^2 k! = (1-1)^2 1! = 0 = 2 + (0-2) \times 1!$
- Supposons P_n pour un entier $n \geq 1$ et montrons P_{n+1} Nous déduisons de $\mathcal{P}_n$ que

$$\begin{aligned}
 S_{n+1} &= \sum_{k=1}^{n+1} (k-1)^2 k! \\
 &= 2 + (n-2) \times (n+1)! + n^2 (n+1)! \\
 &= 2 + ((n-2) + n^2) \times (n+1)! \\
 &= 2 + (n+2)(n-1) \times (n+1)! \\
 &= 2 + (n-1) \times (n+2)!
 \end{aligned}$$

En particulier $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie

En conclusion, la proposition P_n est vraie pour $n \geq 1$.

- c. En reportant les expressions du 1b et du 2b dans la relation trouvée au 2a, il vient alors

$$T_n = S_n + 2W_n = 2 + (n-2) \times (n+1)! + 2((n+1)! - 1) = (n-2+2) \times (n+1)! = n \times (n+1)! \quad (n \geq 1)$$

Pour $n \geq 1$, on a alors $T_n = r_n \times (n+1)!$ avec $r_n = n$.

Exo III. Edhec E 2003.

- La fonction $x \mapsto e^x - 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et s'annule en 0. A fortiori, $e^x - 1$ est strictement négatif sur $] -\infty, 0[$ et strictement positif sur $]0, +\infty[$. Pour $x \in \mathbb{R}^*$, a fortiori, on a $\frac{e^x - 1}{x} > 0$
- a. La fonction $g : x \mapsto xe^x - e^x + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée

$$g'(x) = e^x + xe^x - e^x = xe^x \quad (x \in \mathbb{R})$$

Comme cette dérivée est du signe de x , la fonction g décroît strictement sur $] -\infty, 0[$ de 1 à $g(0) = 0$, puis elle croît strictement sur $]0, +\infty[$ de 0 à $+\infty$.

- b. En particulier, $g(x)$ est strictement positif sur $\mathbb{R}^*$ et nul en 0.

On pose $f(x) = \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)$

- Nous déduisons de l'inégalité établie en 1 que

$$\begin{aligned}
 x \in \mathcal{D}f &\iff x \neq 0 \text{ et } \frac{e^x - 1}{x} > 0 \\
 x \in \mathcal{D}f &\iff x \neq 0
 \end{aligned}$$

En particulier, $\mathcal{D}f = \mathbb{R}^*$.

- a. Nous remarquons que la fonction $h : x \mapsto e^x - 1 - x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que sa dérivée

$$h'(x) = e^x - 1$$

est du signe de x (car l'exponentielle est strictement croissante et $e^0 = 1$). A fortiori, h décroît sur $] -\infty, 0[$, de $+\infty$ à $g(0) = 0$ et croît sur $]0, +\infty[$, de 0 à $+\infty$. A fortiori, la fonction h est positive sur $\mathbb{R}$, de sorte que $e^x \geq 1 + x$ pour $x \in \mathbb{R}$

- b. D'après l'inégalité précédente, lorsque x est strictement positif, on a

$$\frac{e^x - 1}{x} \geq \frac{x + 1 - 1}{x} = 1$$

De sorte que $f(x) = \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) \geq \ln(1) = 0$ Lorsque x est strictement négatif, on a $0 > e^x - 1 \geq 1 + x - 1 = x$ De sorte que

$$\frac{e^x - 1}{x} \leq \frac{x}{x} = 1$$

A fortiori, $f(x) = \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) \leq \ln(1) = 0$

5. Comme $f(x) = \ln\left(\frac{e^x}{x}(1 - e^{-x})\right)$, il résulte du théorème de croissance comparée que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ puis que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{x} = 0^+$, nous remarquons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Enfin (plus difficile), il résulte de la définition d'un nombre dérivé en 0 de l'exponentielle que

$$1 = exp'(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{e^x - e^0}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{e^x - 1}{x}$$

De sorte que l'on a, par continuité du logarithme en 0, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} f(x) = 1$

6. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{e^x - 1}{x}\right)' \times \frac{1}{\frac{e^x - 1}{x}} \\ &= \frac{x e^x - (e^x - 1)}{x^2} \times \frac{x}{e^x - 1} \\ &= \frac{g(x)}{x^2} \times \frac{x}{e^x - 1} \\ &= \frac{g(x)}{x(e^x - 1)} \quad (x \in \mathbb{R}^*) \end{aligned}$$

7. La fonction g est strictement positive sur $\mathbb{R}$ de sorte que $f'(x)$ est du signe de $x(e^x - 1)$, qui est toujours positif. c'est à dire $f'(x)$ est strictement positive sur $\mathbb{R} \setminus \{0,1\}$ A fortiori, f croît sur $] -\infty, 0[$, de $-\infty$ à 0, puis f croît sur $]0,1[$, de 0 à $f(1) = \ln(e - 1) \in]0,1[$, puis f croît sur $]1, +\infty[$, de $\ln(e - 1)$ à $+\infty$.
8. a. Soit $x \in \mathbb{R}^*$, nous déduisons des propriétés du logarithme et de l'exponentielle que

$$\begin{aligned} f(x) - x &= \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) - x = \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) - \ln(e^x) \\ &= \ln\left(\frac{e^x - 1}{x e^x}\right) = \ln\left(\frac{1 - e^{-x}}{x}\right) \\ &= f(-x) \quad (x \in \mathbb{R}^*) \end{aligned}$$

- b. Sur $\mathbb{R}_+^*$, le nombre $f(x) - x$ a le signe de $f(-x)$ d'après la relation précédente. En particulier $f(x) - x < 0$ pour $x > 0$.
- c. L'équation $f(x) = x$ ne peut pas avoir de solution sur $\mathbb{R}_+^*$ d'après le résultat précédent.

mon dessin... (mais il faut faire figurer l'allure (les branches infinies) en $-\infty$ (asymptote horizontale) et en $+\infty$ (asymptote oblique)

10. On introduit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 > 0$ et par $u_{n+1} = f(u_n)$

a. Pour $n \in \mathbb{N}$, prouvons par récurrence la proposition

$$P_n : u_n > 0$$

- P_0 est vraie car $x_0 > 0$ d'après l'énoncé
- Supposons P_n pour un entier $n \geq 0$ et montrons P_{n+1} Comme u_n est strictement positif d'après $\mathcal{P}_n$ et comme f est strictement positive sur $\mathbb{R}^+$, nous remarquons que $u_{n+1} = f(u_n) > 0$. Donc $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie

En conclusion, la proposition P_n est vraie pour $n \in \mathbb{N}$.

- b. Comme $u_n > 0$ et comme $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \leq 0$ d'après le résultat de la question 8b. Nous remarquons que la suite (u_n) est décroissante et minorée par 0. A fortiori, elle converge vers une limite finie ℓ .
- c. Montrons par l'absurde que $\ell = 0$. Supposons que $\ell \neq 0$. Alors, en faisant tendre n vers l'infini dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, nous obtenons que $\ell = f(\ell)$. Nous remarquons que

$$\begin{aligned} \ell = f(\ell) &\iff \ell = \ln\left(\frac{e^\ell - 1}{\ell}\right) \\ &\iff e^\ell = \frac{e^\ell - 1}{\ell} \\ &\iff \ell e^\ell = e^\ell - 1 \\ &\iff \ell e^\ell - e^\ell + 1 = 0 \\ &\iff g(\ell) = 0 \end{aligned}$$

Or la fonction g ne s'annule qu'en 0 donc $\ell = 0$, ce qui est impossible. Nous avons donc bien montré que $\ell = 0$.

Exo IV. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = u_1 = 1$, $u_2 = \epsilon$ et

$$u_{n+3} = 4u_{n+2} - 5u_{n+1} + 2u_n \quad (n \geq 0)$$

1. Pour $n \geq 0$, on pose $v_n = u_{n+1} - u_n$

a. Nous remarquons que

$$\begin{aligned} v_n &= u_{n+1} - u_n \\ v_{n+1} &= u_{n+2} - u_{n+1} \\ v_{n+2} &= u_{n+3} - u_{n+2} \end{aligned} \quad (n \geq 0).$$

Nous observons d'abord que

$$u_{n+3} = 4u_{n+2} - 5u_{n+1} + 2u_n \iff u_{n+3} - 4u_{n+2} + 5u_{n+1} - 2u_n = 0 \quad (n \geq 0)$$

Puis que

$$u_{n+3} - 4u_{n+2} + 5u_{n+1} - 2u_n = v_{n+2} - 3v_{n+1} + 2v_n \quad (n \geq 0)$$

De sorte que la suite (v_n) satisfait la récurrence linéaire d'ordre 2.

$$v_{n+2} - 3v_{n+1} + 2v_n = 0 \quad (n \geq 0)$$

b. Comme le polynôme caractéristique associé à la récurrence linéaire précédente est

$$X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2),$$

qui admet les racines distinctes 1 et 2, nous remarquons qu'il existe un unique couple de nombres réels (λ, μ) tel que

$$v_n = \lambda 1^n + \mu 2^n = \lambda + \mu 2^n \quad (n \geq 0).$$

Comme $v_0 = u_1 - u_0 = 1 - 1 = 0$ et comme $v_1 = u_2 - u_1 = 2 - 1 = 1$, nous observons que

$$\begin{cases} 0 &= v_0 = \lambda + \mu \\ 1 &= v_1 = \lambda + 2\mu \end{cases}$$

Ce système admet pour unique solution $\mu = 1$ et $\lambda = -1$ de sorte que

$$v_n = -1 + 2^n \quad (n \geq 0).$$

2. Première méthode.

a. Nous procédons de même qu'en 1a en remarquant que

$$\begin{aligned} a_n &= u_{n+1} - 2u_n \\ a_{n+1} &= u_{n+2} - 2u_{n+1} \\ a_{n+2} &= u_{n+3} - 2u_{n+2} \end{aligned} \quad (n \geq 0).$$

Et nous observons aussi que

$$u_{n+3} - 4u_{n+2} + 5u_{n+1} - 2u_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n \quad (n \geq 0)$$

De sorte que la suite (a_n) satisfait la récurrence linéaire d'ordre 2.

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0 \quad (n \geq 0).$$

- b. Nous procédons de la même façon qu'en 1b. Comme le polynôme caractéristique associé à la récurrence linéaire précédente est

$$X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2,$$

qui admet la racine double 1, nous remarquons qu'il existe un unique couple de nombres réels (λ, μ) tel que

$$a_n = \lambda 1^n + \mu n 1^n = \lambda + \mu n \quad (n \geq 0).$$

Comme $a_0 = u_1 - 2u_0 = 1 - 2 = -1$ et comme $v_1 = u_2 - 2u_1 = 2 - 2 = 0$, nous observons que

$$\begin{cases} -1 & = a_0 = \lambda \\ 0 & = a_1 = \lambda + \mu \end{cases}$$

Ce système admet pour unique solution $\mu = -1$ et $\lambda = -1$ de sorte que

$$a_n = -1 - n \quad (n \geq 0).$$

- c. Comme $v_n = u_{n+1} - u_n = 2^n - 1$ et comme $a_n = u_{n+1} - 2u_n = -1 - n$, nous remarquons que

$$u_n = (u_{n+1} - u_n) - (u_{n+1} - 2u_n) = v_n - a_n = 2^n - 1 - (-n - 1) = 2^n - 1 + n + 1 = 2^n + n \quad (n \geq 0)$$

3. Seconde méthode

- a. Pour $n \geq 1$, nous déduisons du principe des sommes télescopiques que

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} v_k &= \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} u_{k+1} - \sum_{k=0}^{n-1} u_k \\ &= \sum_{k'=1}^n u_{k'} - \sum_{k=0}^{n-1} u_k \\ &= u_n - u_0 \end{aligned}$$

En particulier, on a bien $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k + u_0$

- b. En injectant le résultat de 1b dans la somme précédente, nous obtenons une somme géométrique de raison $2 \neq 1$, de sorte que

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 + \sum_{k=0}^{n-1} v_k \\ &= 1 + \sum_{k=0}^{n-1} (2^k - 1) \\ &= 1 + \sum_{k=0}^{n-1} 2^k + \sum_{k=0}^{n-1} 1 \\ &= 1 + \frac{2^0 - 2^n}{1 - 2} + n \\ &= 1 + \frac{1 - 2^n}{-1} + n \\ &= n + 1 - (1 - 2^n) \\ &= n + 2^n \quad (n \geq 0) \end{aligned}$$